

dance à Brazzaville que pendant un mois ou deux à la période de transition entre la saison sèche et la saison des pluies, pour ne plus faire pendant tout le reste de l'année que de rares apparitions ou disparaître complètement. Les mêmes espèces, au contraire, se maintiennent sensiblement toute l'année ou tout au moins durant toute la saison des pluies le long des rivières où la nourriture leur est largement assurée par la présence du gros gibier.

II

TERRITOIRE MILITAIRE DU TCHAD.

(Les Tabanides de cette région ont été communiqués par M. le commandant des troupes du Territoire militaire.)

TABANUS AFRICANUS ♀ Gray. — Laï, parc aux Bœufs du poste; poste de Massenya, 20 août. Ce Taon, d'après les indications du D^r Kerandel, se nourrit aussi du sang des Hippopotames. — Nom indigène : *Ken dogo* ou *Ter al Diamouss* (Taon des bœufs).

TABANUS DITOENIATUS ♀ Macquart. — Laï, parc aux Bœufs du poste (août 1907). — Nom indigène : *Ter Abbioi* (Taon à tête blanche).

TABANUS BIGUTTATUS Wied, var. *Cilipes* ♀ Macquart. — Poste de Massenya, août 1907.

TABANUS BIGUTTATUS Wied, var. *Croceus* ♀ Surcouf. — Poste de Massenya (août 1907).

TABANUS TOENIOLA ♀ Pal. Beauv. — Massenya (18 août). — Nom indigène : *N'gaya Illi* ou *Ter Azarak*.

TABANUS SOCHUS ♀ Walker. — Poste de Haouni (communiqué par M. le Vétérinaire Montard).

HEMATOPOTA TRIMACULATA ♀ Newstead. — Environs de Carnot, Baï, M'Bato (Haute-Sangha). — Envoi du D^r Eckenroth.

HEMATOPOTA STRIGIPENNIS ♀ Karsch. — Même région.

DESCRIPTION D'UN TABANIDE (HEMATOPOTA) D'ABYSSINIE,

PAR M. JACQUES SURCOUF.

Hæmatopota sidamensis ♀ nov. sp. — Type femelle provenant des bords de la Deyé, région du Sidamo (Abyssinie). Recueilli le 24 juillet 1907, par M. Hubert Latham; une autre femelle du même lieu. Collection du Muséum.

Espèce voisine du groupe comprenant : *HEMATOPOTA COPEMANI* ♀ Austen, *H. pertinens* ♀ Austen et *H. Laverani* ♀ Surcouf.

Longueur : 9 millimètres.

Couleur générale grisâtre, thorax sombre, abdomen gris brunâtre. Ailes ayant le centre clair. Jambes brunes, tibias antérieurs sombres dans les $\frac{2}{3}$ apicaux, deux anneaux aux tibias postérieurs.

Tête brune, yeux glabres, joues blanches à pubescence jaunâtre, ne portent pas de taches noires de chaque côté; bande frontale d'un gris brunâtre rétrécie vers le vertex et marquée d'une tache noire de chaque côté: cette tache est petite et tangente aux yeux; tache médiane nulle. Callosité noir brillant, étroite, transverse, arrondie à son bord supérieur, un peu élargie contre l'œil auquel elle est tangente; bord postérieur bisinué, prolongé à sa partie médiane par un trait noir descendant entre les antennes. Palpes allongés, noirâtres, à poils jaunâtres. Antennes : 1^{er} et 2^e articles noir cendré à pubescence fauve peu dense; 3^e article allongé, rougeâtre à la base, noir ensuite.

Thorax d'un brun grisâtre à lignes blanches peu distinctes et portant une pubescence jaunâtre peu dense. Flancs et pectus semblables. Scutellum gris noirâtre.

Abdomen gris jaunâtre, étroit, allongé, portant sur le milieu de chaque segment une fascie indistincte plus brune; pubescence jaunâtre, plus dense vers le bord des segments. Ventre semblable. Ailes translucides, un peu jaunes à stigma brun, présentant des parties ombrées à toutes les nervures transverses. Seules les cellules du tour de l'aile présentent des dessins: la cellule discoïdale hyaline, sans dessins; 1^{re} cellule marginale postérieure ne présentant de traits que dans sa partie apicale. Cuillerons blanchâtres. Balanciers d'un gris jaunâtre.

Pattes : cuisses noires à pubescence cendrée et quelques poils jaunes; tibias antérieurs noirs portant un court anneau jaunâtre visible presque uniquement à la face externe, genoux clairs; tibias médians et postérieurs jaunâtres, portant deux anneaux noirâtres, étroits, le premier médian, le second apical. Tarses noirs aux pattes antérieures; les autres tarses sont clairs à la base de chaque segment et sombres depuis le milieu jusqu'à l'apex. Pubescence des pattes concolore.

NOTES SUR LES TABANIDES (PANGONIA) DE LA COLLECTION DU MUSÉUM.

PAR M. JACQUES SURCOUF.

Parmi les Tabanides les plus caractéristiques de Madagascar, la *Pangonia zigzag* Macquart se distingue tout d'abord par la brièveté relative de son appareil vulnérant et les bandes claires de ses ailes noires.